

**Campanha de Sobrevivência a Sepse
CHECK-LIST**

Data/hora do diagnóstico médico de sepse ou choque séptico: ____/____/____

**Itens do pacote de 1 hora e check 6
horas**

Data/hora

- () Colher lactato arterial sérico _____/_____/____ à(s) ____:____
- () Colher duas hemoculturas _____/_____/____ à(s) ____:____
- () Administrar antimicrobiano intravenoso adequado Prescrição:____/____/____ à(s) ____:____
Liberação: ____/____/____ à(s) ____:____
Administração: ____/____/____ à(s) ____:____
- () Checar lactato sérico Valor: _____ Checagem: ____/____/____ à(s) ____:____
- () Se lactato alterado (≥ 2 x valor normal), administrar 30 mL/kg de cristaloides
- () Se hipotensão, administrar 30 mL/kg de cristaloides
- () Se persistência de hipotensão, iniciar noradrenalina Início: ____/____/____ à(s) ____:____
- () Se lactato alterado (≥ 2 x valor normal), coletar nova amostra de lactato arterial em até 4h após reposição volêmica Valor: _____ Coleta:____/____/____ à(s) ____:____
- () Se hipotensão e/ou hiperlactatemia, avaliar o *status* volêmico e perfusão nas primeiras 6 horas

Avalie pelo menos uma das opções abaixo e registre em prontuário:

- () Mensuração de PVC
- () Variação de pressão de pulso
- () Variação de distensibilidade de cava
- () Elevação passiva de membros inferiores
- () Outras formas de avaliação de responsividade a volume
- () Melhora do nível de consciência
- () Melhora da diurese
- () Mensuração de SvcO₂
- () Melhora do tempo de enchimento capilar
- () Melhora da intensidade de lvedo

Registro no prontuário dessa avaliação: ____/____/____ à(s) ____:____

PARABÉNS!!

O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!