

PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE

Prezado(a) _____.

No dia _____ você deu o primeiro atendimento ao paciente

_____ em quem foi feito o diagnóstico de sepse.

Como você sabe, estamos envolvidos na implementação de protocolo gerenciado de sepse em nossa instituição, procurando otimizar o atendimento prestado ao doente em sepse. Por isso, segue abaixo a avaliação de aderência aos nossos indicadores das primeiras horas do atendimento a esse paciente.

Você e sua equipe foram fundamentais para o alcance desses resultados.

- () sim () não - Colhido lactato sérico em até uma hora
- () sim () não - Colhido hemocultura em até uma hora e antes do antimicrobiano
- () sim () não - Administrado antimicrobiano em até uma hora
- () sim () não - Se lactato duas vezes o valor normal, iniciada a administração de 30mL/Kg de cristaloides em 1 hora ou feita justificativa no prontuário
- () sim () não - Se hipotensão, iniciada a administração de 30 mL/kg de cristaloides em 1 hora ou feita justificativa no prontuário
- () sim () não - Se manteve hipotensão, iniciado **vasopressor (dentro da primeira hora da hipotensão)**
- () sim () não - Se lactato alterado (≥ 2 x valor normal), coletado nova amostra de lactato arterial após reposição volêmica, entre 2 e 4 horas após o diagnóstico
- () sim () não - Avaliação do *status* volêmico e perfusão dos pacientes hipotensos e/ou com hiperlactatemia nas primeiras 6 horas

PARABÉNS!!

O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!

PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE

Prezado(a) _____.

No dia _____ você deu o primeiro atendimento ao paciente

_____ em quem foi feito o diagnóstico de sepse.

Como você sabe, estamos envolvidos na Campanha de Sobrevivência a Sepse, procurando otimizar o atendimento prestado ao doente em sepse na nossa instituição. Por isso, segue abaixo a avaliação de aderência aos nossos indicadores das seis primeiras horas do atendimento a esse paciente.

Você e sua equipe foram fundamentais para o alcance desses resultados.

- () sim () não - Colhido lactato sérico
- () sim () não - Colhido hemocultura antes do antimicrobiano
- () sim () não - Administrado antimicrobiano antes de uma hora
- () sim () não - Se lactato duas vezes o valor normal, administrado 30mL/Kg de cristalóide em 1 hora
- () sim () não - Se hipotensão, administrado 30 mL/kg de cristalóide em 1 hora
- () sim () não - Se manteve hipotensão, iniciado vasopressor **dentro da primeira hora da hipotensão**
- () sim () não - Se lactato alterado (≥ 2 x valor normal), coletado nova amostra de lactato arterial após reposição volêmica entre 2 e 4 horas após o diagnóstico
- () sim () não - Avaliação do *status* volêmico e perfusão dos pacientes hipotensos e/ou hiperlactatêmicos nas primeiras 6 horas

Precisamos melhorar!

O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!